



CUZEB



Composición: MANCOZEB 17,5% + OXICLORURO DE COBRE 22% (EXPR. EN CU) [WP] P/P Nº de Registro **22.908**

Polvo Mojable (WP)
USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES



de Oxicloruro de Cobre + 17,5 % de Mancozeb, presentada en polvo mojable (WP), para tratamiento principalmente de primavera, con una dispersión y mojabilidad fuera de lo que vemos en el mercado, siendo similar a un WG. Resulta efectivo en el control de repilo, alternariosis, antracnosis, mildius, monilia, moteado, royas, septoria y otras enfermedades producidas por hongos endoparásitos.



USOS Y DOSIS RECOMENDADAS				
USO	AGENTE	DOSIS %	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN	P.S.
OLIVO	REPILO	0,4	Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 20-25 días, mediante pulverización normal con tractor o manual con mochila en primavera, o una en primavera y otra en otoño desde BBCH 10 (desarrollo de las hojas) a BBCH 85 (aumenta la coloración específica de los frutos).	14
TOMATE	ALTERNARIA MILDIU SEPTORIA ANTRACNOSIS	0,4	(Industrial y fresco al aire libre): Realizar máximo 4 tratamientos por campaña, con un intervalo de 7-14 días entre los mismos, mediante pulverización normal con tractor o manual con mochila desde BBCH 15 (La 3ª hoja verdadera del tallo principal, desplegada) a BBCH 89 (madurez completa).	10

Distribuido por:



Productos AJF, SL

www.productosajf.es 955853211 / 954850323 Ctra. A-360 – Km. 41,8 41530 Morón de la Frontera (SEVILLA)